

NOTICE: INFORMATION DE L'UTILISATEUR

BRONCHOSSEDAL MUCUS Miel & Citron 20 mg/ml sirop *Guaifénésine*

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 7 jours.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que Bronchosedal Mucus Miel & Citron et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Bronchosedal Mucus Miel & Citron
3. Comment prendre Bronchosedal Mucus Miel & Citron
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver Bronchosedal Mucus Miel & Citron
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. QU'EST CE QUE BRONCHOSSEDAL MUCUS MIEL & CITRON ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Bronchosedal Mucus Miel & Citron 20 mg/ml sirop est un médicament utilisé pour aider à soulager la toux profonde.

Il contient:

de la guaifénésine (un expectorant) pour aider à détacher les mucosités des poumons et ainsi faciliter l'expectoration et libérer les voies respiratoires obstruées.

La composition de ce médicament ne provoque pas de somnolence. Ce médicament est destiné à une utilisation chez les adultes et les adolescents à partir de 12 ans.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE BRONCHOSSEDAL MUCUS MIEL & CITRON ?

Ne prenez jamais Bronchosedal Mucus Miel & Citron 20 mg/ml sirop

si vous êtes allergique à la guaifénésine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre Bronchosedal Mucus Miel & Citron,

- si vous souffrez de toux qui persiste depuis plus de 7 jours ou récidive ou s'accompagne de fièvre, d'une éruption de la peau ou d'un mal de tête persistant.
- si vous avez une toux persistante, qui peut être causée par de l'asthme.
- si vous avez une toux avec expectoration de très abondantes mucosités (glaires).
- si vous souffrez de troubles graves du foie ou des reins.
- si vous consommez de l'alcool.

Autres médicaments et Bronchosedal Mucus Miel & Citron

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament. Ceci s'applique aussi à un médicament obtenu sans ordonnance.

Il est déconseillé de prendre ce médicament en même temps que d'autres médicaments contre la toux (antitussifs ou sédatifs de la toux) car ces derniers peuvent entraver l'action de ce médicament. Ce médicament peut affecter les résultats de certaines analyses d'urine si ces dernières sont effectuées 24 heures après la prise de ce médicament. Avertissez le médecin ou l'infirmière recueillant l'échantillon d'urine que vous prenez ce médicament.

Bronchosedal Mucus Miel & Citron avec des aliments et boissons

Vous pouvez prendre ce médicament avec ou sans aliments ou boissons.

Grossesse, allaitement et fertilité

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Ce médicament ne doit pas être utilisé pendant la grossesse sauf sur recommandation d'un médecin. Si vous allaitez, ne prenez pas ce médicament avant d'avoir demandé l'avis d'un médecin ou d'un pharmacien.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Ce médicament ne devrait pas affecter votre capacité de conduire ou d'utiliser des machines. Toutefois, si vous ne vous sentez pas bien, abstenez-vous de conduire ou d'utiliser des machines.

Bronchosedal Mucus Miel & Citron 20 mg/ml sirop contient

- 4,7% d'éthanol (alcool), ceci peut représenter jusqu'à 400 mg par dose et est équivalent à environ 10 ml de bière ou 4 ml de vin par dose de 10 ml. Ceci peut être néfaste pour les personnes qui souffrent d'alcoolisme. Il faut tenir compte du taux d'éthanol chez les femmes enceintes ou qui allaitent, chez les enfants et chez les groupes de patients à haut risque comme les patients souffrant de maladies du foie ou d'épilepsie.
- glucose et saccharose. Si votre médecin vous a dit que vous ne tolérez pas certains sucres, prenez contact avec lui avant de prendre ce médicament. Contient environ 2 g de saccharose par dose. Il faut en tenir compte chez les patients diabétiques.

3. COMMENT PRENDRE BRONCHOSDAL MUCUS MIEL & CITRON ?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Ce sirop doit être pris par la bouche exclusivement.
Ne pas dépasser la dose recommandée.

Age	Dose
Adultes et adolescents à partir de 12 ans	Prenez 10 ml (deux cuillerées à café de 5 ml), quatre fois par jour
Enfants de moins de 12 ans	Ne pas administrer
Patients souffrant de troubles des reins ou du foie	Consultez d'abord un médecin ou un pharmacien

N'utilisez PAS plus de 4 doses (40 ml) par 24 heures.

Si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après une semaine, consultez un médecin.

Si vous avez pris plus de Bronchosedal Mucus Miel & Citron que vous n'auriez dû

Si une personne a pris trop de ce médicament, consultez immédiatement un médecin, pharmacien ou le Centre Antipoisons (070/245.245) et montrez cette notice et l'emballage.

Si vous prenez trop de ce médicament, vous pouvez développer des calculs rénaux.

Les symptômes peuvent inclure:

Troubles de l'estomac, nausées et somnolence.

Si vous oubliez de prendre Bronchosedal Mucus Miel & Citron

Veillez à toujours prendre Bronchosedal Mucus Miel & Citron en suivant exactement les instructions de cette notice. Si vous avez oublié de prendre ce médicament, prenez la dose suivante dès que c'est nécessaire. Ne prenez pas de double dose pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Ne prenez pas plus de 4 doses (40 ml) par 24 heures.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Si vous présentez une des réactions suivantes, arrêtez immédiatement de prendre ce médicament et consultez un médecin:

- Réactions allergiques y compris une éruption de la peau (qui peut être grave et entraîner des cloques et une desquamation (peau qui pèle)) et des démangeaisons.

D'autres effets indésirables pouvant se produire comprennent:

- Douleurs d'estomac
- Nausées
- vomissements
- diarrhée
- maux d'estomac

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via l'Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé, Division Vigilance, Eurostation II, Place Victor Horta 40/40, B-1060 Bruxelles (www.afmps.be; patientinfo@fagg-afmps.be) (pour la Belgique) ou via la Direction de la Santé, Division de la Pharmacie et des Médicaments, Villa Louvigny, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg (pour le Luxembourg).

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER BRONCHOSSEDAL MUCUS MIEL & CITRON ?

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

Il n'existe aucune précaution particulière de conservation pour ce médicament.

N'utilisez pas ce médicament si le sceau de fermeture du flacon est brisé à l'achat.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur le flacon et la boîte après 'EXP'. La date d'expiration fait référence au dernier jour de ce mois.

A utiliser dans les 6 mois après la première ouverture.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ni avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

Ce que contient Bronchosedal Mucus Miel & Citron 20 mg/ml sirop

La substance active est: guaifénésine. Ce médicament contient 100 mg de guaifénésine par 5 ml.

Les autres composants sont:

citrate de sodium, acide citrique, carbomère, glycérol, éthanol, glucose, saccharose, sucralose, benzoate de sodium (E211), caramel (E150), arôme de miel, arôme de citron, arôme rafraîchissant, lévomenthol, arôme à effet pétillant, arôme hot mix, exhausteur de goût, masqueur d'amertume et eau.

(Pour de plus amples informations sur certains des composants, voir la rubrique 2).

Aspect de Bronchosedal Mucus Miel & Citron 20 mg/ml sirop et contenu de l'emballage extérieur
Bronchosedal Mucus Miel & Citron 20 mg/ml sirop est un sirop de couleur jaune brun destiné exclusivement à une utilisation orale.

Il est disponible en flacons en verre ambré de 150 ml ou de 300 ml munis d'un bouchon en plastique avec sécurité enfants.

Veuillez conserver la boîte.

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché:

Johnson & Johnson Consumer NV/SA
Antwerpseweg 15-17
B-2340 Beerse

Fabricant:

Famar Orléans
5 Avenue de Concyr
45071 Orléans
Cedex 2, France

Ou

Johnson & Johnson Consumer NV/SA, Antwerpseweg 15-17, 2340 Beerse, Belgique

Numéro de l'autorisation de mise sur le marché

BE432171

Mode de délivrance

Médicament non soumis à prescription médicale.

Ce médicament est autorisé dans les États membres de l'EEE sous les noms suivants :

BE	Bronchosedal Mucus Honing & Citroen 20 mg/ml siroop
BG	Хекспекторал Мед&Лимон 20 mg/ml сироп

CY	Benylin Mucus Cough Honey & Lemon Flavour 20 mg/ml Syrup
CZ	OlynMuco s příchutí medu a citronu 20 mg/ml
EE	Sudafed Broncho Honey & Lemon 20 mg/ml siirup
EL	Hexacough Warm Honey & Lemon
LU	Bronchosedal Mucus Miel & Citron 20 mg/ml sirop
PL	Sudafed Muco na kaszel mokry o smaku miodu i cytryny
RO	Hexpectral Honey & Lemon 20mg/ml syrup
SK	OlynMuco s příchutí medu a citrónu 20 mg/ml
SI	Hexpectral z okusom medu in limone 20 mg/ml sirup
SE	Nipenesin 20 mg/ml sirap
UK	Benylin Mucus Cough Max Honey & Lemon Flavour 100 mg/5ml Syrup

La dernière data à laquelle cette notice a été révisée est 06/2018.