

**NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR  
DETTOLMEDICAL CHLOROXYLENOL 4.8% SOLUTION A DILUER POUR  
APPLICATION CUTANEE**

**POUR USAGE EXTERNE UNIQUEMENT**

**Informations importantes concernant certains composants de Dettolmedical Chloroxylenol 4.8% Solution à diluer pour application cutanée**

Ce produit contient du chloroxylénol 4,8% comme principe actif, qui est susceptible de provoquer une irritation cutanée.

Il doit être dilué avec de l'eau avant l'utilisation.

Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement

Ce médicament est disponible sans ordonnance. Cependant, pour obtenir des résultats optimaux, vous devez respecter scrupuleusement les instructions d'utilisation de Dettolmedical Chloroxylenol 4.8% Solution à diluer pour application cutanée.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

**Dans cette notice**

1. Qu'est-ce que Dettolmedical Chloroxylenol 4.8% Solution à diluer pour application cutanée et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Dettolmedical Chloroxylenol 4.8% Solution à diluer pour application cutanée
3. Comment utiliser Dettolmedical Chloroxylenol 4.8% Solution à diluer pour application cutanée
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver Dettolmedical Chloroxylenol 4.8% Solution à diluer pour application cutanée
6. Informations supplémentaires

**1. QU'EST-CE QUE DETTOLMEDICAL CHLOROXYLENOL 4.8% SOLUTION A DILUER POUR APPLICATION CUTANEE ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISE**

Dettolmedical Chloroxylenol 4.8% Solution à diluer pour application cutanée, qui produit une solution laiteuse après dilution dans de l'eau, est un antiseptique topique utilisé pour le nettoyage de plaies mineures telles que coupures, éraflures et piqûres ou morsures d'insectes.

Il se présente sous une forme concentrée et nécessite une dilution avant l'utilisation.

**N'utilisez jamais Dettolmedical Chloroxylenol 4.8% Solution à diluer pour application cutanée sous une forme non diluée**

## **2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER DETTOLMEDICAL CHLOROXYLENOL 4.8% SOLUTION A DILUER POUR APPLICATION CUTANEE**

Ne pas utiliser chez les enfants de moins de 12 mois.

### **N'utilisez jamais Dettolmedical**

- Si vous souffrez d'eczéma (une maladie de la peau caractérisée par une peau sèche et qui pèle)
- Si vous êtes allergique (hypersensible) au chloroxylénol ou à l'un des autres composants contenus dans Dettolmedical Chloroxylénol 4.8% Solution à diluer pour application cutanée.

Ne pas utiliser ce produit dans la région des yeux, des oreilles, du nez ou de la bouche.  
Ne pas utiliser sur grandes surfaces du corps ou sur une peau sensible.

En cas d'ingestion, rincez abondamment la bouche et buvez une grande quantité d'eau ou de lait.  
En cas de contact accidentel avec les yeux, les oreilles, le nez ou la bouche, nettoyer abondamment à l'eau froide. Dans les deux cas, consultez un médecin.

En cas d'utilisation du produit non dilué, nettoyez la peau et consultez un médecin si une réaction cutanée se développe.

### **Utilisation d'autres médicaments**

Etant donné qu'aucune étude spécifique n'a été réalisée, nous ne pouvons recommander l'utilisation de Dettolmedical Chloroxylénol 4.8% Solution à diluer pour application cutanée en association avec un quelconque autre produit pour application locale.

### **Grossesse et allaitement**

Dettolmedical Chloroxylénol 4.8% Solution à diluer pour application cutanée peut être utilisé pendant la grossesse sous surveillance médicale. Il est déconseillé d'appliquer Dettolmedical Chloroxylénol 4.8% Solution à diluer pour application cutanée sur la peau des seins pendant l'allaitement.

### **Conduite de véhicules et utilisation de machines**

Dettolmedical Chloroxylénol 4.8% Solution à diluer pour application cutanée n'influera pas votre capacité à conduire des véhicules ou à utiliser des machines

## **3. COMMENT UTILISER DETTOLMEDICAL CHLOROXYLENOL 4.8% SOLUTION A DILUER POUR APPLICATION CUTANEE**

Réservé à un usage cutané.

Coupures, morsures, éraflures et piqûres d'insectes - Diluer 50ml de Dettolmedical Chloroxylénol 4.8% dans 1 litre d'eau (rapport de dilution : 1/20) et nettoyer la zone affectée au moyen de cette solution. Recouvrir de gaze sèche ou d'une compresse.

Utilisation réservée aux adultes et enfants de plus de 12 mois.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

**Si vous avez pris plus de Dettolmedical que vous n'auriez dû**

Si vous avez pris trop de Dettolmedical Chloroxylenol 4.8% Solution à diluer pour application cutanée, prenez immédiatement contact avec votre médecin, votre pharmacien ou le Centre Anti-Poison (070 / 245.245).

**Si vous oubliez de prendre Dettolmedical**

Non applicable.

**Si vous arrêtez de prendre Dettolmedical**

Non applicable.

#### **4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS**

Comme tous les médicaments, Dettolmedical Chloroxylenol 4.8% Solution à diluer pour application cutanée peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde. Ces effets indésirables sont :

-Très rares (ils se produisent chez moins d'1 personne sur 10.000).

Des réactions cutanées ont été observées lorsque ce produit a été utilisé pour nettoyer des plaies cutanées. Ces réactions incluaient irritation, éruptions cutanées, dégénérescence cutanée progressive, plaies au niveau du site d'application, inflammation, décoloration de la peau, démangeaisons, desquamation et décollement cutanés, et sensation de brûlure. Des cas de chute de cheveux ont également été rapportés.

-Fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponible) :  
Réactions allergiques, sensibilisation de la peau, brûlure au site d'application.

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national :

**Belgique:** Site internet: [www.afmps.be](http://www.afmps.be), e-mail: [patientinfo@fagg-afmps.be](mailto:patientinfo@fagg-afmps.be)

**Luxembourg:** Site internet: <http://www.ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.html>

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

#### **5. COMMENT CONSERVER DETTOLMEDICAL CHLOROXYLENOL 4.8% SOLUTION A DILUER POUR APPLICATION CUTANEE**

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser Dettolmedical Chloroxylenol 4.8% Solution à diluer pour application cutanée après la date de péremption mentionnée sur l'étiquette après {exp}. La date d'expiration fait référence au dernier jour du mois. Ce médicament ne requiert pas de précautions particulières de conservation. La solution doit être utilisée immédiatement après dilution.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

## **6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES**

### **Que contient Dettolmedical Chloroxylenol 4.8% Solution à diluer pour application cutanée**

- Le principe actif est le chloroxylénol à raison de 4,8mg/100ml de solution à diluer pour application cutanée
- Les autres composants sont : huile de pin, alcool isopropylique, savon d'huile de ricin, caramel (E150c) et eau purifiée

### **Qu'est-ce que Dettolmedical Chloroxylenol 4.8% Solution à diluer pour application cutanée et contenu de l'emballage extérieur**

Dettolmedical Chloroxylenol 4.8% Solution à diluer pour application cutanée est un liquide transparent ambré. Après dilution dans de l'eau, il se transforme en une solution blanche laiteuse. Il est disponible en flacons de 125ml, 250ml, 500ml, 750ml, 1000ml et 1250ml. (Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées).

**Mode de délivrance:** Médicament non soumis à prescription médicale

### **Numéro de l'Autorisation de Mise sur le Marché**

BE343016

BE343025

### **Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché et fabricant**

#### Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché :

Reckitt Benckiser Healthcare (Belgium) NV/SA

Allée de la Recherche 20

B-1070 Bruxelles

#### Fabricant:

Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Ltd, Dansom Lane, Hull HU8 7 DS, East Yorkshire, UK

ou

RB NL Brands B.V.

WTC Schiphol Airport, Schiphol Boulevard 207, 1118 BH Schiphol, NL

**Ce médicament est autorisé dans les Etats membres de l'EEE sous les noms suivants**

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| Belgique   | Dettolmedical Chloroxylenol 4.8% |
| Pays-Bas   | Dettol Med Chloorxylenol 48 mg/g |
| Luxembourg | Dettolmedical Chloroxylenol 4.8% |

**La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est 04/2019.**