

Médicament homéopathique

OEMéd

Quand les gouttes Dr. Reckeweg R63 Endangitin sont-elles utilisées?

Selon la conception homéopathique, les gouttes Dr. Reckeweg R63 Endangitin peuvent être utilisées, sur prescription de votre médecin, comme adjuvant en cas de troubles circulatoires périphériques.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si les gouttes Dr. Reckeweg R63 Endangitin peuvent être prises simultanément.

Quand les gouttes Dr. Reckeweg R63 Endangitin ne doivent-elles pas être utilisées ou seulement avec précaution?

Aucune limitation d'emploi n'est connue à ce jour. Si le médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné, aucune précaution particulière n'est requise.

Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si:

- vous souffrez d'une autre maladie,
- vous êtes allergique,
- vous prenez déjà d'autres médicaments en usage interne ou externe (même en automédication)!

Les gouttes Dr. Reckeweg R63 Endangitin peuvent-elles être prises/utilisées pendant la grossesse ou l'allaitement?

Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si le médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Toutefois, aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée. Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments durant la grossesse et l'allaitement ou demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Comment utiliser les gouttes Dr. Reckeweg R63 Endangitin?

Sauf prescription contraire du médecin, prendre 10 à 15 gouttes 3 fois par jour dans un peu d'eau. En cas de fortes douleurs, prendre au début 10 gouttes toutes les 1 à 2 heures. Ne changez pas de votre propre chef le dosage prescrit. Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte.

Quels effets secondaires les gouttes Dr. Reckeweg R63 Endangitin peuvent-elles provoquer?

L'emploi approprié du médicament n'a donné lieu à aucun effet secondaire attesté à ce jour. Si vous remarquez toutefois des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien. La prise de médicaments homéopathiques peut aggraver passagèrement les troubles (aggravation initiale). Si cette aggravation persiste, cessez le traitement avec les gouttes Dr. Reckeweg R63 Endangitin et informez votre médecin ou votre pharmacien.

A quoi faut-il encore faire attention?

Le médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur le récipient. Conserver à température ambiante (15 – 25 °C) et hors de portée des enfants. Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien. Les gouttes contiennent 36% vol. d'alcool.

Que contiennent les gouttes Dr. Reckeweg R63 Endangitin?

10 ml contiennent: Cuprum aceticum D6 1 ml, Secale cornutum D4 1 ml, Tabacum D4 1 ml, Veratrum album D6 1 ml, eau et alcool comme excipients. Contient 36% vol. d'alcool.

Numéro d'autorisation

45090

Où obtenez-vous les gouttes Dr. Reckeweg R63 Endangitin? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie sur ordonnance médicale. Flacons compte-gouttes de 50 ml.

Titulaire de l'autorisation

Laboratoire Jacques Reboh et fils SA

Route de la Glâne 4

CH-1680 Romont

Fabricant

Pharmazeutische Fabrik Dr. Reckeweg & Co. GmbH

D - 64625 Bensheim

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en 10/2006 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

Publié le 27.05.2014